

CHLORAMINOPHENE® Chlorambucil

INDICATIONS AMM

Le *chlorambucil* est un agent alkylant bifonctionnel du groupe des moutardes à l'azote, déprimant surtout la lignée lymphoïde, indiqué dans le traitement :

- de la leucémie lymphoïde chronique
- des lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Médicament qui peu être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville (LISTE I) Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible, sous plaquettes thermoformées:

- boîte de 30 gélules blanches dosées à 2 mg

A conserver à une température ne dépassant pas 25 C.

POSOLOGIE

Il est recommandé de prendre la dose journalière **en une fois, le matin et à jeun** :

- 1 à 6 gélules par jour tous les jours en traitement continu,
- ou 6 à 10 mg/m²/j pendant 5 jours tous les 30 jours.

Chez le malade insuffisant rénal, si clairance < 30ml/min, diminuer les posologies: 3 à 5 mg/m²/j.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Contre indiqué : vaccin contre la fièvre jaune.

A prendre en compte :

-Ciclosporine, tacrolimus : immunodépression excessive avec risque de pseudolymphomes.
 (Le chlorambucil étant aussi un immunosuppresseur déprimant sélectivement la lignée lymphoïde).

-Vaccins vivants atténués : risque de maladie généralisée éventuellement mortelle. Utiliser un vaccin inactivé lorsqu'il existe (poliomyélite).

EFFETS INDESIRABLES	Prévention	Conduite à tenir
Leucopénie	Surveillance des signes d'infection. Surveillance hématologique fréquente et régulière.	Dose dépendante et cumulative. Réversible. Arrêt du traitement à voir avec le spécialiste si le taux des granulocytes (polynucléaires) est inférieur à 2G/L.
Thrombopénie	Surveillance des signes d'hémorragies. Surveillance hématologique fréquente et régulière.	Dose dépendante et cumulative. Réversible. Voir avec le spécialiste pour une adaptation posologique.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments fris, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers.	Traitement antiémétique standard éventuel. Ne pas reprendre la prise ou doubler la suivante en cas de vomissements. Si vomissement >1 par 24h, arrêt du traitement et adaptation posologique à voir avec le spécialiste.

EFFETS INDESIRABLES	Prévention	Conduite à tenir
Eruption cutanée	Eviter le soleil et toute exposition à la chaleur. Eviter les vêtements et les chaussures trop serrées. Utiliser un savon doux sans parfum. Eviter les travaux irritants pour les mains. Eviter les pansements adhésifs.	Tremper les mains et les pieds dans l'eau fraîche, puis sécher sans frotter. Appliquer une crème émolliente (type Dexéryl®). Analgésiques standards si nécessaire (paracétamol). Voir avec le spécialiste pour une adaptation posologique, voire un arrêt du traitement.

Surveillance pulmonaire clinique et radiologique en cas de traitement prolongé. Surveillance hépatique. Chez l'homme, provoque une oligospermie, ou azoospermie en général définitive. Chez la femme, provoque une aménorrhée et une ménopause précoce.

RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS



Le CHLORAMINOPHENE® se prend **en une prise** avec un grand verre d'eau **à jeun**.
Ne pas ouvrir les gélules.



Les gélules ne doivent pas être ouvertes, ni mâchées.



Pendant le traitement, il est important de boire davantage pour maintenir le bon fonctionnement du rein.



Ne pas jeter les emballages ni les gélules dans votre poubelle. Rappelez les blisters vides et gélules restants à la pharmacie pour renouvellement du mois suivant.



Ne pas laisser à la portée des enfants.



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. **Le patient doit préciser à son médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) qu'il prend ou qu'il souhaite prendre.**



Ne pas prendre CHLORAMINOPHENE® en cas de grossesse et d'allaitement. Utilisez une méthode de contraception efficace.



En cas d'oubli d'une prise, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante. Prendre la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



- **Contactez rapidement le médecin prescripteur** en cas de:
- fièvre/signes infectieux pour réaliser une NFS en urgence.
- signes hémorragiques.
- difficulté à respirer ou toux anormale (radio du thorax: fibrose pulmonaire possible).

REMARQUES :

Pour une information complète, se reporter au RCP.